

Labidura herculeana

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **forbicina gigante** o **forbicina di Sant'Elena** (*Labidura herculeana* FABRICIUS, 1798) era un dermattero diffuso unicamente sull'isola di Sant'Elena, nell'Oceano Atlantico meridionale.

Fu descritto per la prima volta dall'entomologo danese Johan Christian Fabricius nel 1798.

Indice

Descrizione

Biologia

Distribuzione e habitat

Conservazione

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Descrizione

Poteva raggiungere gli 8,5 cm di lunghezza, il che ne faceva il più grande dermattero allora esistente.

Il corpo era tozzo e schiacciato, di color nero lucido con riflessi iridescenti; le zampe tendevano al rosso, le elitre erano piuttosto corte, mentre le ali erano del tutto assenti.

Biologia

Si nutriva probabilmente per la massima parte di materiale vegetale.

Di giorno restava nascosto nelle crepe della roccia, dalle quali fuoriusciva di notte e nei giorni di pioggia.

Distribuzione e habitat

Forbicina gigante



Labidura herculeana

Stato di conservazione



Estinto (1967)^[1]

Classificazione scientifica

<u>Dominio</u>	<u>Eukaryota</u>
<u>Regno</u>	<u>Animalia</u>
<u>Sottoregno</u>	<u>Eumetazoa</u>
<u>Ramo</u>	<u>Bilateria</u>
<u>Phylum</u>	<u>Arthropoda</u>
<u>Subphylum</u>	<u>Tracheata</u>
<u>Superclasse</u>	<u>Hexapoda</u>
<u>Classe</u>	<u>Insecta</u>
<u>Sottoclasse</u>	<u>Pterygota</u>
<u>Coorte</u>	<u>Exopterygota</u>
<u>Subcoorte</u>	<u>Neoptera</u>
<u>Superordine</u>	<u>Polyneoptera</u>
<u>Ordine</u>	<u>Dermaptera</u>

Era diffuso nella parte orientale dell'isola di Sant'Elena, dove prediligeva le zone rocciose e pianeggianti.

Famiglia Labiduridae
Genere Labidura
Specie ***L. herculeana***

Nomenclatura binomiale

Labidura herculeana

FABRICIUS, 1798

Conservazione

La scomparsa dell'habitat dove questa specie viveva e l'introduzione sull'isola di predatori, come i ratti, i centopiedi (*Scolopendra morsitans*) ed il passero, oltre che la continua domanda da parte dei collezionisti, hanno via via ridotto il numero di esemplari di questa specie, tanto che tre successive spedizioni sull'isola (1988, 1993, 2003) non sono riuscite a catturarne alcun esemplare. Nel 2014, una nuova spedizione non è riuscita a trovare nessun esemplare e, dato che l'ultimo esemplare vivo era stato rinvenuto nel 1967, quest'insetto è stato classificato dall'IUCN come estinto (*Extinct*).

Note

- [^] (EN) *Labidura herculeana*, su *IUCN Red List of Threatened Species*, Versione 2019.2, IUCN, 2019.

Bibliografia

- Invertebrates of Prosperous Bay Plain, St. Helena (<http://kidstonmill.org.uk/docs/PBP%20Invertebrate%20Report%20Text%20only.doc>) A survey by Philip and Myrtle Ashmole – September-December 2003 – Commissioned by the St Helena Government and financed by the Foreign and Commonwealth Office

Voci correlate

- Gigantismo insulare

Altri progetti

- Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it>) contiene immagini o altri file su **Labidura herculeana** (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Labidura_herculeana?uselang=it)
- Wikispecies (<https://species.wikimedia.org/wiki/?uselang=it>) contiene informazioni su **Labidura herculeana** (https://species.wikimedia.org/wiki/Labidura_herculeana?uselang=it)

Collegamenti esterni

- The Giant Earwig of St. Helena – The Dodo of the Dermaptera*, su *earwigs-online.de*.
- Labidura herculeana*, su *kidstonmill.org.uk*.

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Labidura_herculeana&oldid=108390909"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 21 ott 2019 alle 12:37.

Il testo è disponibile secondo la [licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo](#); possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le [condizioni d'uso](#) per i dettagli.